

Oír

Pensar

Hablar

¿Cómo aplicar el Test de Ling?

- ✓ Inicialmente se debe decir cada sonido al lado del niño, cerca de las prótesis de su hijo asegurándose de que se encuentra en un medio ambiente agradable y tranquilo.
- ✓ Luego ir aumentando la distancia a 1 metro, a 2 metros y luego 3 metros. Una vez que su hijo detecte el sonido (girando la cabeza, mirando, sonriendo, señalando, etc.) debe recibir una reafirmación del mismo: "Bien, ¡has escuchado lo que te he dicho!".
- ✓ Es muy importante que cuando diga el sonido, se utilice un tono de voz normal asegurándose de que no está mirando a la cara sino que está escuchando y no leyendo los labios.
- ✓ También es importante que no se le dé entonación al sonido, sino que los seis sonidos se digan de forma neutral con la misma duración, ya que se modifica algún patrón suprasegmental (entonación) su hijo percibirá esa diferencia y no el sonido en sí mismo.
- ✓ Si su hijo no responde a un sonido trata de decir el sonido de nuevo, esta vez sí dándole pistas, por ejemplo, alargar el sonido un poco. Si su hijo no responde al sonido pase al siguiente y asegúrese de hablar sobre esto con su logopeda y su audiólogo.

